



Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO: INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO
“A. MANZONI”
Alessandria d. R. – Bivona – Cianciana – San Biagio P. – Santo Stefano Q.

Circ. n. 135

Alessandria d. R., 12/12/2025

I.C. "A. MANZONI"
Alessandria della Rocca (AG)
Prot. 0015217 del 12/12/2025
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni
Al personale ATA

I.C. A. Manzoni

Al DSGA

Al sito web
Bacheca "Registro Classeviva"

Oggetto: Prevenzione e gestione ossiuriasi a scuola

Si sono verificati casi di ossiuriasi (vermi) tra i bambini frequentanti la nostra scuola, già sottoposti prontamente a trattamento da parte dei propri pediatri, pertanto in riferimento a quelle che sono le norme in materia di salute ed igiene (Circolare del Ministero della sanità n° 4 del 13 marzo 1998), si chiede ai genitori dei bambini la responsabilità della prevenzione e identificazione della ossiuriasi, attraverso un controllo scrupoloso e sistematico dei propri figli.

La presente nota informativa è finalizzata a permettervi di individuare precocemente eventuali sintomi di ossiuriasi e valutare così col vostro pediatra la necessità di praticare approfondimenti.

L'ossiuriasi è un'infestazione parassitaria frequente in età pre-scolare e scolare (meno frequente negli adulti) dovuta al verme *Enetrobius vermicularis*. Essa colpisce tutte le classi socio-economiche in quanto il contagio non è correlato a cattive condizioni igieniche ambientali né a contatti con animali, ma è puramente inter-umano passando da bimbo a bimbo per trasmissione oro-fecale. Nelle forme sintomatiche infatti i bambini tendono ad avere prurito anale, soprattutto notturno, con disturbi del sonno e irritabilità, e nel grattarsi l'ano raccolgono le uova del parassita sotto le unghia diffondendole poi nell'ambiente circostante domestico e scolastico e trasmettendole così ad altri bambini.

La terapia dell'infestazione è semplice e risolutiva nella maggior parte dei casi. Il vostro pediatra e il medico curante valuteranno in base ai casi, l'opportunità di effettuare la terapia a tutta la famiglia ove sia presente un caso affetto.

Il test diagnostico più sensibile per rilevare la presenza di uova di ossiuri nelle fasi precoci e asintomatiche dell'infestazione (ancor prima che compaiano vermi visibili nelle feci) è lo Scotch



Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO: INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO

“A. MANZONI”

Alessandria d. R. – Bivona – Cianciana – San Biagio P. – Santo Stefano Q.

Test, di semplice esecuzione, non invasivo e di basso costo, eseguibile presso qualsiasi laboratorio territoriale o ospedaliero.

E' importante essere tutti vigili nel rilevare eventuali sintomi e, nel dubbio, discuterne col proprio pediatra.

Il compilatore
(prof A.Montalbano)

Il Dirigente scolastico
Marinella Carmela La Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.2, c.3, del D.lgs 39/93